La mise en œuvre de l'ACV sur les filères agricoles : les questions méthodologiques posées

Benoît GABRIELLE

UMR INRA AgroParisTech Environnement et grandes cultures, Grignon.

Benoit.Gabrielle@agroparistech.fr

Plan

Des impacts & enjeux multiples

Une variabilité qui impacte
l'ensemble des calculs

Quelles conséquences
méthodologiques pour les ACV?

Quelles marges de progrès ?

Conclusion: nécessité d'une
approche territoriale

Impacts pris en compte dans l'ACV

Comment prendre en compte la biodiversité ?

Fig. 2. Predicted proportional changes in the populations of the 19 FBI species between 1970 and 2020 under three land management scenarios (16). Line colors represent current UK conservation status categories (17). Population growth rates estimated from parameter estimates were derived from the model of total risk score used to illustrate predicted responses.

Butler et al., 2007

Systemes agricoles et industriels

Variabilité des rendements et des émissions

Une variabilité présente à toutes les étapes de l'évaluation

Implications pour l'évaluation des impacts

Fertilisation N
Gestion interculture
Pratiques élevage

Lessivage NO₃
sous racines
Emissions NH₃,
N₂O, NO

Pollution NO₃ des nappes,
Eutrophisation
Dépôt atmosphérique
Effet de serre

Fermeture captage
Santé humaine
Pertes biodiversité
Changement
climatique

Variabilité
des pratiques...

...des émissions
au niveau
des sources...

... du devenir
des polluants ...

...et des sensibilités
des milieux
récepteurs
(cibles)

Des performances variables

Distribution des émissions de GES pour la pomme de terre (Nemecek et al in Pfister 2010).

Caractéristiques régionales: efficacité d'utilisation de l'engrais azoté

Efficiences d'utilisation de l'engrais pour le blé d'hiver en France, simulées par des modèles agronomiques et économiques couplés (Bontems et al., 2008). Fourchette: 20 – 70 kg grains / kg engrais

Les limites de l'approche 'facteur d'émissions'

Modèle biophysique de bilan environnemental

Les émissions de gaz à effet de serre sont hétérogènes

Emissions
annuelles
d'oxyde nitreux
(un gaz à effet
de serre lié aux
apports
d'engrais)
dans la Beauce

[Gabrielle et al.,
2006]

Effets de la variabilité des émissions de N_2O sur le bilan effet de serre

Effets de variations régionales des émissions de N₂O et de l'efficacité d'utilisation de l'azote

sur les émissions de gaz à effet de serre du bio-éthanol (France, EU – Gabrielle et al.,

De la source à l'impact: exemple de l'eutrophisation

Pour les bassins versants bretons, le facteur de devenir (N_2/N_1) varie entre 50 et 85% (Basset-Mens, 2006)

Des milieux plus ou moins sensibles

Impacts agrégés 'Eco-Indicators' sur l'eau, par kg de coton aux USA/Mexique.
Source: Pfister, 2010.

its/sources: l'impact des émissions de NO sur la qualité de l'air à l'éch

Production photochimique

Contribution des sols agricoles à la formation d'ozone troposphérique en Ile de France, le 28 Mai 2001.

NOx biogénique

COV biogénique

Dépôt sur végétation/sol

Rolland (2008)

Les impacts globaux sont plus faciles à estimer

Evaluation plus difficile

Echelle globale

N_2O

CO_2

NO_x

Effet de serre

Couche d'ozone

Fiable

Echelle régionale

NO_x

NO_3

NH_3

Pesticides

Ozone troposphérique

Acidification

Pollution des nappes

Echelle locale

Eutrophisation

Pollution des nappes

Diapo: G. Gosse, INRA

Conclusion

Bilan

La performande du système dépend des caractéristiques physiques et agronomiques locales
Et de la configuration spatiale / cibles ou autres sources de polluants

Le territoire doit être pris en compte

Mais nécessite des données fines sur les systèmes de cultures, les émissions et les impacts

La modélisation biophysique peut permettre de prédire la variabilité des systèmes et les interactions spatiales

La 'différentiation spatiale' dans les ACV ouvre des pistes majeures d'amélioration de la performance environnementale

Bibliographie

- Basset-Mens, C. Propositions pour une adaptation de l'analyse de cycle de vie aux systèmes de production agricole. Mise en oeuvre pour l'évaluation environnementale de la viande porcine. AgroCampus Ouest, Rennes, France., 2005
- Butler, S. J.; Vickery, J. A. & Norris, K. Farmland Biodiversity and the Footprint of Agriculture Science, 2007, 315, 381-384
- Bontems, V., Cara, S. D., Gabrielle, B., Jayet, P. A. & Zakharov, P. Projections des émissions de gaz à effet de serre d'origine agricole : Données, méthodes et intégration dans le système SCEGES UMR Economie Publique, INRA, AgroParisTech, 2008
- Gabrielle, B.; Soimakallio, S.; Bessou, C. & Mäkinen, T. Life-cycle assessment of conventional liquid biofuels for transport: consensus or confusion ? Proceedings of XVIIth International Biomass Conference, Hamburg, July 2009.
- Pfister, S. Regionalization in LCA. ETH Zürich, 2010 (www.ifu.ethz.ch/ESD)
- Rolland, M.-N. Modélisation biophysique des émissions de NO par les sols agricoles, spatialisation et impact sur la chimie troposphérique à l'échelle régionale. Université Paris 6, 2008.